



SY1863

<b>Druh:</b> Arenaria montana	
<b>Odrůda:</b> Blizzard	
Velice kompaktní odrůda, bílé kvítky.	
<b>Firma:</b> Syngenta	<b>Velikost nádoby:</b> 11-14 cm
<b>Termín kvetení:</b> III-VI	<b>Zaštipování:</b> Ne
<b>Prodejní měsíc:</b> III-IV	<b>Regulátory růst:</b> Pokud je to nutné
<b>Výška:</b> 15-20 cm	<b>Délka kultury po přesazení:</b> 20-24 týdnů
<b>Expozice:</b> Částečný stín	
<b>Forma osiva:</b> Natural	
<b>CENA:</b> 452,50 Kč (1000 semen)	

<b>Použití</b>	Vhodná do skalky a při extenzivních střešních výsadbách.
<b>Výsevní termín</b>	Výsev od ledna do března pro nekvetoucí sadbu, červen až srpen pro kvetoucí sadbu.
<b>Způsob výsevu</b>	2-3 semena do jedné cely sadbovače, možný také přímý výsev několika semen do nádoby.
<b>Klíčení</b>	9-14 dní při teplotě 18-20 °C. Semena lehce zasypeme vermikulitem. Od druhé fáze klíčení snižujeme teplotu na 18 °C a před další závlakou necháme částečně vyschnout substrát. Nepřelévat.
<b>Následné pěstování</b>	4-5 týdnů po výsevu přesazujeme 2-3 rostliny do 6-10 cm květináče. Optimální je pro růst teplota 15-18 °C. Pro iniciaci kvetení je nutné 8 týdnů teplot pod 10 °C a dlouhé dny. Rostliny mohou být rychleny při 15-18 °C po dobu 6-8 týdnů pro kvetení na jaře.
<b>Substrát</b>	Používejte dobře propustný pěstební substrát pro trvalky s 0-15 % jílu, 0-15 % organických částí (např. dřevěná vlákna, kůra), 1-1,5 kg/m <sup>3</sup> kompletního vyváženého hnojiva, 1-2 kg/m <sup>3</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 6,0-7,0.
<b>Teploty</b>	Pěstování při teplotě 15-18 °C nebo venku. V zimě ve skleníku při 3-5 °C nebo venku, kde je ale nutné rostliny zakrýt textilií. Na jaře začnou rostliny růst, když je 10-11 týdnů teplota mezi 15-18 °C. Nízké teploty 7-12 °C prodlužují délku kultivace.
<b>Hnojení</b>	Nízké nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 60-80 ppm dusíku (při 2 kg/m <sup>3</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu), používáme kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po půlce září! Na jaře hnojení 60-80 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu. Je vhodné preventivně aplikovat 1-2krát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. V případě nedostatku železa nutné aplikovat 1-2krát cheláty železa. Kořeny jsou citlivé na vysoké koncentrace solí v substrátu.

*Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.*